

AIDS、胃肠道手术、糖尿病、器官移植、妊娠、分娩、恶性肿瘤以及静脉用毒品等<sup>[3]</sup>。(2)内源性细菌性眼内炎和真菌性眼内炎的临床体征不同,真菌性眼内炎病变常在眼底后极,尤其是黄斑或其邻近部位出现一个,有时也可有 2~3 个互不联系的孤立病灶。病灶通常呈圆形或椭圆形,大小从 0.5~2 个视盘直径,边界一般较清晰,颜色灰白。病灶表面的玻璃体因炎症浸润而变混浊,如未进行及时治疗,病变发展,病灶扩大,色泽由早期的灰白转为黄白色;玻璃体混浊也进一步加重而掩盖其下的脉络膜视网膜病灶。这与本病例的眼部检查相一致(图 1)。(3)最终的诊断应取决于实验室培养结果,本病例术中抽取玻璃体腔液培养证实了真菌感染的诊断。

本例患者双眼同时发病,病情凶险,但因及时采取了

玻璃体切除手术联合抗真菌药物治疗,术后保存了一定的视功能。随着抗生素和激素的广泛应用内源性眼内炎发病率有所升高,所以眼部表现为葡萄膜炎症状,同时伴有内源性眼内炎易感因素时应高度怀疑内源性眼内炎的可能,尽早给予相应检查及治疗,以免延误治疗时机造成患者视功能永久丧失。

#### 参考文献

- 1 高永峰,郭希让. 内源性真菌性眼内炎的诊断和治疗. 国外医学(眼科学分册)2004;28(4):258-261
- 2 王伟,徐格致. 18 例内源性眼内炎临床特征及预后分析. 中国实用眼科杂志 2004;22(1):63-65
- 3 Flynn HW Jr. The clinical challenge of endogenous endophthalmitis. Retina 2001;21:572-574

#### · 病例报告 ·

## 视网膜脱离手术后健眼近视 1 例

王雨晴,于永斌,张明红,郭艳,李志胜

作者单位:(150000)中国黑龙江省哈尔滨市,哈尔滨医科大学第一附属医院眼科医院

作者简介:王雨晴,在读硕士研究生,研究方向:眼底病、眼外伤。  
通讯作者:于永斌,副院长,主任医师,博士,硕士研究生导师.

wangyuqing2146541@163.com

收稿日期:2010-04-26 修回日期:2010-06-02

王雨晴,于永斌,张明红,等. 视网膜脱离手术后健眼近视 1 例. 国际眼科杂志 2010;10(7):1454

#### 0 引言

我院 2009 年发现 1 例视网膜脱离手术后健眼近视患者,现报告如下。

#### 1 病例报告

患者,男,35 岁,糖尿病病史 10a,因“左眼视网膜脱离”入院。入院时情况:全身情况:血糖 8.0mmol/L,血压正常。眼部检查:左眼视力光感,右眼视力 1.0。左眼眼压 9mmHg,右眼眼压 14mmHg。左眼结膜充血,角膜透明,前房轴深,房水清,瞳孔圆,对光反射(+),晶状体透明,玻璃体混浊,眼底可见视网膜青灰色隆起累及黄斑,右眼未见异常。B 超显示:左眼视网膜脱离。A 超显示:双眼的眼轴正常。入院后给予抗炎药物治疗,完善检查后局部麻醉下行左眼玻璃体切除+硅油填充+视网膜激光光凝术。术后俯卧位并给予局部及全身抗生素和激素治疗。术后第 1d 血糖 14.0mmol/L,内分泌科会诊,给予降糖药物治疗,血糖逐渐下降。术后第 1d 右眼视力 1.0,术后第 3d 视力 0.8,以后右眼视力逐渐下降,术后第 10d 视力 0.5,近视度数 Jr1。综合验光检查右眼:(1.00DS = 1.0)。

术后激素逐渐减量至停用,术后 1mo 俯卧位改为自由体位,术后 20d 右眼视力 0.6,术后 2mo 复查右眼视力 1.0。

#### 2 讨论

本病例患者术前和术后眼科检查包括裂隙灯,眼底镜都未发现右眼前节和后节有明显异常。只是术后血糖升高,检查结果无法解释右眼视力下降,后经综合验光检查,发现右眼轻度近视,其矫正视力达到 1.0,所以我们考虑这应该是屈光性近视。术后 2mo 右眼裸眼视力达到正常,说明这应该是一过性的视力下降。近视眼的屈光概念,指在调节静止状态下,外界平行光线入眼内聚焦于视网膜感光细胞之前这样的一种屈光状态<sup>[1]</sup>。屈光性近视有很多类型:弯曲性近视;轴性近视;位置性近视;指数性近视<sup>[2]</sup>。下面我们进一步探讨这种视力下降的原因:(1)血糖原因:术前和术后血糖发生变化很大,术后血糖突然升高,有可能会引起晶状体的曲率变大,从而引起弯曲性近视,造成视力下降。(2)体位原因:由于玻璃体切除手术中常填充可以吸收的惰性气体和不可吸收的硅油等填充物,所以术后需要长时间的俯卧位,这样才能更好的使填充物顶压视网膜达到视网膜复位的目的,这样同时也将使晶状体前表面的曲度增大,从而造成视力下降。(3)药物原因:由于玻璃体切除术后要减轻炎症反应,所以全身及局部应用糖皮质激素治疗,激素可以通过全身作用到晶状体,使晶状体曲率发生变化,从而引起屈光的变化。通过对本病例的观察,提示我们以后玻璃体切除术后不光要观察术眼的变化情况,还要观察健眼的变化。另外,是否所有玻璃体切除术后健眼都发生屈光性改变,还需要大量的临床病例论证,有待于临床进一步观察。

#### 参考文献

- 1 崔浩,王宁利,杨培增,等. 眼科学. 北京:人民卫生出版社 2008;214
- 2 刘家琦,李凤鸣,吴静安,等. 实用眼科学. 第 2 版. 北京:人民卫生出版社 2003;618