

洗之后,大约只有 10% 的药物留在了眼表<sup>[6]</sup>, MMC 组以 0.3g/L 的浓度作用 5min, 未发生任何与之相关并发症, 强调中等浓度, 短时间使用。本研究显示: 两种术式的比较中, 带角膜缘干细胞的自体结膜移植复发率最低。角膜创面修复时间最短, 术后恢复最快, 为  $3.15 \pm 0.66$ d。但与 MMC 组差异无明显统计学意义。

综上所述, 无缝线法较缝线法, 不需缝合结膜, 手术简洁, 创伤小, 速度快, 适合大批量的复明手术, 且患者在手术后没有缝线造成的异物感, 术后结膜刺激反应明显轻于缝线手术, 同时无需拆线, 适合偏远山区, 无法复诊拆线的老年、贫困、以及行动不便的患者。

#### 参考文献

1 孙传电, 孙立新, 张凌, 等. 羊膜及角膜缘上皮移植治疗复发性翼状

胬肉. 眼外伤职业眼底病杂志 2001;23(1):42-43

2 谢立信. 眼科手术学——理论与实践. 第 3 版. 北京: 人民卫生出版社 2003:121

3 Kheirkhah A, Izadi A, Kiarudi MY, et al. Effects of mitomycin C on corneal endothelial cell counts in pterygium surgery: role of application location. Am J Ophthalmol 2011;151(3):488-493

4 Song JS, Kim JH, Yang M, et al. Mitomycin-C concentration in cornea and aqueous humor and apoptosis in the stroma after topical mitomycin-C application: effects of mitomycin-C application time and concentration. Cornea 2007;26(4):461-467

5 王大博. 丝裂霉素眼毒性作用的研究. 中国实用眼科杂志 2000;18(3):131

6 陈祖基. 实用眼科药理学. 北京: 中国科学技术出版社 1993:205

#### · 短篇报道 ·

## 下穹隆成形术矫正老年性下睑外翻的临床观察

杨影

作者单位: (610072) 中国四川省成都市, 四川省医学科学院 四川省人民医院眼科

作者简介: 杨影, 硕士, 主治医师, 研究方向: 斜弱视、眼整形和泪道疾病。

通讯作者: 杨影. bgyld@163.com

收稿日期: 2011-05-20 修回日期: 2011-08-18

杨影. 下穹隆成形术矫正老年性下睑外翻的临床观察. 国际眼科杂志 2011;11(10):1837

#### 0 引言

老年性睑外翻仅限于下脸部, 由于老年人的眼轮匝肌功能减弱, 眼睑皮肤及外眦韧带也较松弛, 使睑缘不能紧贴眼球, 并因下睑本身的重量使之下坠而引起下睑外翻, 由于睑缘位置异常从而导致流泪, 不断向下拭眼泪的动作使外翻加重<sup>[1]</sup>。本文采用下穹隆成形术对 15 例 20 眼老年性下睑外翻进行治疗, 手术后获得了较满意的效果, 现报道如下。

#### 1 临床资料

选取 2009-01/2010-04 手术治疗 15 例 20 眼老年性下睑外翻患者, 其中男 11 例 15 眼, 女 4 例 5 眼; 双眼 5 例,

单眼 10 例; 年龄 55~78(平均 65)岁。15 眼下睑内 1/2 睑球分离、下泪点外翻, 5 眼整个下睑睑球分离、下泪小点外翻, 均有严重的溢泪症状, 6 眼结膜粗糙, 1 眼下方角膜湿润。手术方法: 采用结膜下与皮下浸润麻醉, 用 1-0 丝线在下穹隆的结膜囊处进针, 根据患者下睑外翻的范围作 1~3 对褥式缝线, 经过眶下缘前面骨膜, 在相对的下睑皮肤面穿出, 埋线于皮下。15 例 20 眼患者经过治疗, 睫缘复位, 泪小点无内外翻, 无溢泪, 效果满意, 随访 3mo~1a, 未见复发。其中 1 例角膜湿润患者, 炎症得以控制, 无后遗症, 大部分结膜粗糙患者, 结膜均已恢复正常。

#### 2 讨论

由于老年人眼睑组织松弛、延长, 使下睑失去其固有张力, 加上重力的作用, 使下睑离开眼球而外翻。下睑外翻由于结膜长期暴露, 得不到泪液的滋润, 使得睑结膜干燥、充血、肥厚甚至角化。轻者可有溢泪, 频繁地向下拭泪, 使下睑逐渐松弛, 失去张力, 加之重力关系, 使睑外翻更趋严重<sup>[2]</sup>, 甚至导致睑裂闭合不全、角膜干燥、上皮脱落, 产生暴露性角膜炎。传统矫正老年性下睑外翻的方法为缩短下睑, 改变下睑松弛状态, 使其重新靠贴眼球<sup>[3]</sup>。本组 15 例 20 眼患者采用下穹隆成形术矫正老年性下睑外翻, 手术操作简单, 皮肤上未作切口, 术后不留瘢痕, 效果满意, 纠正了老年患者因下睑外翻引起的溢泪症状。

#### 参考文献

1 李凤鸣. 眼科全书. 北京: 人民卫生出版社 1999:1022

2 徐乃江. 实用眼成形手术学. 杭州: 浙江科学技术出版社 1987: 54-68

3 李绍珍. 眼科手术学. 北京: 人民卫生出版社 2002:164